



ผู้วิจัย/ผู้นำเสนองาน นายแพทย์กำพล เอี่ยมเกื้อกุล

กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม โทรศัพท์ 043740993-6 โทรสาร 043-711433

Helicobacter Pylori เป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุของการเกิดโรคในกลุ่ม Dyspepsia เช่น Duodenal ulcer (DU), gastric ulcer (GU) และอาจรวมถึง

non – ulcer

dyspepsia

(NUD

)

ซึ่งในการตรวจหาเชื้อ

H. Pylori

มีความสำคัญในการตรวจผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบ

เพราะกลุ่มโรคนี้มีการหายของโรคเพิ่มขึ้นถ้าได้กำจัดเชื้อนี้

โดยพบว่าผู้ป่วยที่ได้กำจัดเชื้อนี้

มีภาวะปวดท้องลดลงเหลือร้อยละ

20

ใน

1

ปี

และผู้ป่วยที่มีเชื้อโรคนี้อยู่ในกระเพาะอาหาร

มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหารมากกว่าคนไม่มีเชื้อถึง

6

ผลการตรวจหาเชื้อ Helicobacter Pylori ในกระเพาะอาหาร ด้วยวิธี

เขียนโดย Administrator

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2009 เวลา 15:40 -

---

เท่า

ดังนั้น

การตรวจหาเชื้อ

H. Pylori

จึงมีความสำคัญมากในกลุ่มผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบ

[เอกสารดาวโหลด](#)